

Semillero perrichufo

Sporophila minuta

María del Mar Varela Vasquez

Tamaño promedio de 8,6 a 9,6 cm



Zonas de color canela anaranjado y parte dorsal es de gris opaco con alas oscuras estriadas

0,6 cm

0,85 cm

Presenta un dimorfismo sexual, que contrasta en la diferenciación del color.

Zonas de colores pardas y amarillas, alas estriadas de color café y su cola oscura

♀



S. minuta tiene un amplio patrón de distribución donde se encuentra desde el occidente de México hasta el noroccidente de Ecuador, Bolivia, Brasil y Argentina. En Colombia se encuentra entre los 1000 - 2300 m sobre el nivel del mar, distribuida en el oriente y occidente de los Andes hasta el Caquetá y el Vaupés¹

*Esta especie no se encuentra en la costa Pacífica, la Cordillera Oriental y el Amazonas



Hymenoptera




Acarina



Cyperaceae y Poaceae

Es una especie que se alimenta principalmente de **semillas de pastos**, pero también puede alimentarse de **artrópodos**, esto depende de la época del año y la disponibilidad²

- Etapa reproductiva en abril, mayo septiembre y octubre¹
- Los nidos se pueden encontrar en pastizales, arbustos o árboles pequeños¹
- La anidación es construida en forma de copa con materiales como pastos secos, hierbas y tallos que se proyectan en el borde del nido¹
- El tamaño de la nidada es de 2-3 huevos, con una coloración blanca con machas rojizas¹



LC

Preocupación menor

Según la lista roja de la IUCN

- En Colombia la población de la especie se ha visto afectada por la cacería y el tráfico ilegal³
- Se deben implementar estrategias para llegar a las personas e informar sobre esta y otro tipo de especies de aves
- La educación ambiental permite comprender las funciones y lo fundamental que es para el ambiente
- Al habitar en el campus de la Universidad ICESI la comunidad universitaria se debe comprometer a informar sobre esta especie, cuidar de ella y su entorno.

Bibliografía

1. Banco de la República. (2016). Espiguero Ladrillo. Babel.banrepcultural.org. <https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054col121/id/170/>
2. Quilique, E., Marín, G., Carvajal, Y., & Ferrer, H. (2010). Componentes de la dieta de *Sporophila minuta*, *S. intermedia* (emberizidae), *Myiozetetes similis* y *Elaenia flavogaster* (Tyrannidae), en un ecotono bosque palustre-basimontano de Venezuela. Boletín Del Centro de Investigaciones Biológicas, 44(2). <https://produccioncientificaluz.org/index.php/boletin/article/view/261>
3. Castro-Vásquez, L. (2016). Aproximación al estado actual del conocimiento de la avifauna del departamento del Atlántico, Colombia. Biota Colombiana, 17(1), 90-117. <https://doi.org/10.21068/c2016v17r01a07>